TESTUDO AREOLATA, *Thunberg.*

Mandibulâ superiori acutè uncinatâ, denticulatâ; squamâ gibbosâ frontali; testâ oblongâ subconvexâ, margine revoluto; scutis sulco profundo separatis, areolis depressis.

La Vermillon. Lacép. Quad. Ovip. 166.
Testudo areolata. Thunb. Nov. Act. Suec. VIII. p. 180.—Schœpff, Test. t. xxiii. p. 104.—Latr. Hist. Nat. Rept. I. p. 157.—Shaw, Gen. Zool. III. p. 50.—Daud. Rept. II. p. 287.—Schweig. Prod. in Konigsb. Archiv. sp. 4.—Merr. Amph. p. 30.—Gray, Syn. Rept. p. 13.
T. pusilla. Daud. Rept. II. p. 299. (neque Linn. nec Schneid.)
Var. scutis marginalibus xxvii.
Testudo Cafra. Daud. Rept. II. p. 291.
T. fasciata ejusd. p. 294.—Merr. Amph. p. 29.

Habitat in Africâ australi, et in Insulâ Madagascar.
Mus. nostr.—Mus. Brit. &c.,

Descriptio. *Caput* magnum, gibbosum, squamosum, fusco-viridescens, squamâ magnâ, corneâ, gibbosâ, rubescente supra nasum. *Mandibulæ* pallidè viridescentes, denticulatæ; *superior* acutè uncinata. *Collum* viridi-fuscum, squamis minutis tectum. *Pedes anteriores* viridescentes, squamis elongatis, lanceolatis, imbricatis, anticè defensi: *posteriores* squamosi. *Ungues* longiores graciles, fusci. *Cauda* crassa, conica, obtusa. *Testa* subconvexa, oblonga, margine revoluto. *Scuta dorsalia* omnia elevata, sulcata, sulco profundo separata, areolis centralibus, depressis, punctatis; color scutorum viridi-flavescens, margine et disco badiis vel fuscis: *vertebralia* elevata, disco truncato-plana, areolis depressis, punctatis, medio carinatis; primum pentagonum, lateribus parallelis; secundum subpentagono-quadratum; tertium quadratum; quartum cuneiforme, posticè truncatum; quintum irregulariter rhomboideum, subverticale: *costalia* declivia; primum latum, anticè productum; secundum et tertium